



| TÍTULO | AUTORES |
|---|---|
| Nota sobre a ocorrência de helmintos em aves de vida livre no Pantanal Matogrossense. | Raso T.F., Schwartz H.O., Silveira L.F., Silva R.J. |
| Fatores de virulência de <i>Escherichia coli</i> isoladas a partir de swabs cloacais de Mutum-do-Nordeste (<i>Pauxi mitu</i>). | Saidenberg A., Allegretti L., Ferreira C.S.A., Ferreira A.J.P., Almeida, M.A., Silveira L.F., Raso T.F. |
| Relato de caso: Utilização do Secnidazol no tratamento de infecção por <i>Giardia</i> spp em papagaio do mangue (<i>Amazona amazonica</i>) utilizando-se o cálculo de dose por extrapolação alométrica. | Fernandes R.S., Kluyber D. & Corrêa V.P. |
| Polineuropatia em cachorros-domato (<i>Cerdocyon thous</i>) compatível com deficiência de vitamina B12 (cobalamina). | Hidasi H.W., Kawanami A.E., Moraes A.C., Guimarães V.Y. & Miranda L.B. |
| Valores de eritrograma e leucometria diferencial em patos (<i>Cairina</i> spp.) mantidos no Parque Antenor Martins, Brasil. | Paiz L.M., Pereira C.I.C., Walter B.S., Alves, S.O., Oliveira V., Martinez F.R., Pádua S.B. & Satake F. |
| Estudo comparativo entre o diagnóstico clínico presuntivo e a avaliação fecal através do exame direto de fezes corado pela técnica de Gram em Psitacídeos atendidos no Ambulatório de Aves/USP. | Guimarães M.B, Matos C.R.L., Allegretti L., Ferreira C.S.A. & Ferreira A.J.P. |
| Utilização da videoendoscopia no diagnóstico de balanite em Jabuti-Piranga (<i>Geochelone carbonaria</i> Spix, 1824) – Relato de caso. | Pessoa C.A., Prazeres R.F., Fecchio R.S., Rodrigues M.A. & Souza P.C. |
| Presença de corpos estranhos no trato gastrointestinal de aves selvagens. | Marques M.V.R., Ferreira Junior F.C., Andery D.A., Venâncio R.D., Araújo A.V., Horta R.S, Costa M.P., Resende J.S. & Martins N.R.S. |
| Hematologia e bioquímica sérica de perdizes (<i>Rhynchotus rufescens</i>) criados em cativeiro. | Ferreira Junior F.C., Marques M.V.R, Andery D.A., Peixoto R.B., Leme F.O.P., Paes P.R.O., Araújo A.V., Venâncio R.D., Resende J.S., Costa M.P., Horta R.S. & Martins N.R.S. |
| Utilização do monitor oscilométrico petMAP® para mensuração não invasiva da pressão arterial em veados catingueiros (<i>Mazama gouazoubira</i>) anestesiados. | Campos M.A.R., Dadá N.L., Fontenelle J.H., Futema F., Credie L.F.G.A., Estrella J.P.N., Braga S.C.S. |



| TÍTULO | AUTORES |
|---|---|
| Descrição anatômica dos acessos venosos para administração farmacológica e venopunção em tamanduá -bandeira (<i>Myrmecophaga tridactyla</i> , LINNAEUS, 1758). | Cruvinel C.A.T., Marques V. B., Polese D. N., Melo A.P.F., Andrade-Cruvinel T.M., Guerra Neto G., Koproski L. & Cassaro K. |
| Anestesia balanceada em tartaruga verde (<i>Chelonia mydas</i>) para remoção de formações papilomatosas cutâneas. | Campos M.A.R., Neto O.M.B., Futema F., Credie L.F.G.A., Estrella J.P.N., Fontenelle J.H., Filho P.L.B., Maracinni P. |
| Indução de nefropatia em cutias (<i>Dasyprocta aguti</i>) para aplicação em Terapia celular: estudo piloto. | Cabral R.M., Ferraz M.S., Sousa F.A.A., Menezes D.J.A., Conde Júnior A.M., Rizzo M.S., Fortes E.A.M., Costa F.A.L. & Carvalho, M. A. M. |
| Determinação por EIA de progesterona e 17 β -estradiol no plasma de cutias (<i>Dasyprocta aguti</i> , Linnaeus, 1766) criadas em cativeiro. | Almeida H.M., Menezes D.J.A., Illera M.J., Illera J.C., Silván G., Ferraz M.S., Machado Júnior A.A.N., Pessoa G.T. & Carvalho, M.A.M. |
| Análise colpocitológica em cutias (<i>Dasyprocta aguti</i>) criadas em cativeiro. | Almeida H.A.; Rodrigues N.M.; Alves F.R.; Ferraz M.S.; Pessoa G.T.; Menezes D.J.A.; Machado Júnior A.A.N. & Carvalho, M.A.M. |
| Estudo morfológico das células do cordão umbilical de cutias (<i>Dasyprocta aguti</i>) criadas em cativeiro. | Conde Júnior A.M.; Ibiapina P.B.; Cabral R.M.; Rocha A.R.; Ferraz M.S.; Rizzo M.S; Fortes E.A.M.; Pessoa G.T. & Carvalho M.A.M. |
| Protocolo anestésico para manejo de <i>Cebus kaapori</i> (Queiroz, 1992). | Futema F., Campos M.A.R., Bueno M.G., DePaula C.D., Luiz T.G., Estrella J.P.N., Credie L.F.G.A. |
| Aspectos Anatômicos das Veias Hepáticas em Tartarugas Verde (<i>Chelonia mydas</i>) Encontradas Mortas no Litoral Pernambucano. | Oliveira R.A.S., Santos R.M.B., Nascimento M.P.C., Melo C.M.F. & Amora T.D. |
| Obstrução por corpo estranho em <i>Ecletus (Ecletus roratus roratus)</i> – Relato de caso e revisão de literatura. | Leal A.A.C., Garcia S.D., Almeida B.F.M., Antello T. F. & Rozza D.B. |
| Determinação dos níveis protéicos de jabutis-piranga (<i>Geochelone carbonaria</i>) criados em cativeiro no Município de Araçatuba-SP. | Aquino M.C.C., Zucatto A.S., Almeida B.F.M., Ferreira V.B.C., Leal A.A.C., Bonello F.L., Azevedo E.Z., Bomfim S.R.M. |



| TÍTULO | AUTORES |
|--|--|
| Avaliação da metodologia biológica direta e da indireta, utilizando o LIPE® como indicador fecal externo, na determinação da digestibilidade aparente da matéria seca, energia bruta e proteína bruta de dois alimentos industrializados para psitacídeos. | Vasconcelos M.N.F, Carvalhaes A.G, Andrade E.A.G, Costa M.P, Horta R.S, Lopes V.E, Velozo L.B, Marques M.V.R, Martins N.R.S, Ferreira W.M, Saliba E.O.S. |
| Redução de fratura diafisária tibial com pino intramedular em tamanduá-bandeira (<i>Myrmecophaga tridactyla</i>). | Kawanami A.E., Moraes A.C., Guimarães V.Y., Hidasi H.W. & Miranda L.B. |
| Análise Histoquímica do Intestino Grosso da Paca (Agouti paca Linnaeus, 1766). | Burger C.P., Cruz C.C., Machado M.R.F., Machado C.R., Kawanami A.E. & Hidasi H.W. |
| Incidência de aves portadoras de <i>Chlamydophila psittaci</i> encaminhadas ao CRAS-PET. | Petri B.S.S., Milanelo L., Fitorra L.S., & Alves M. |
| Ontogenia dos ossos do crânio em embriões de <i>Caiman yacare</i> (Daudin, 1802) (Crocodylia, Alligatoridae). | Santos A.L.Q., Lima F.C., Vieira L.G. & Coutinho M.E. |
| Entubação esofágica para suporte nutricional em tamanduá-bandeira (<i>Myrmecophaga tridactyla</i>). | Santos A.L.Q., De Simone S.B.S., Costa F.R.M., Rodrigues L. L., Jacintho M.F.L., Passos R.R.F.C.F. |
| Diferenciação leucocitária em trinta tubarões-lixá, <i>Ginglymostoma cirratum</i> , mantidos em cativeiro, no Brasil. | Napoleão S.R., Ranzani-Paiva M.J.T., Cunha P.M. |
| Ocorrência de helmintoses gastrointestinais em macacos-prego (<i>Cebus apella</i>) mantidos em cativeiro no zoológico de São Bernardo do Campo. | Napoleão S.R., Pinto, C.M., Cunha P.M., Gomes M.S. |